

Jean-François GAUTIER

Université Paris-Cité, Hôpital Lariboisière, Paris



Décryptage de l'histoire naturelle de la sévérité de l'atteinte hépatique chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et de MASLD : L'étude QUID-NASH Follow-Up

La stéatopathie métabolique (MASLD) touche 30% de la population adulte mondiale, surtout en lien avec l'obésité et la résistance à l'insuline. Elle est la première cause de maladie hépatique chronique, avec un risque de cirrhose et de cancer du foie. Les patients diabétiques de type 2 (DT2) sont particulièrement exposés, surtout aux formes sévères. Cependant, l'évolution naturelle de la MASLD reste mal connue.

L'étude QUID-NASH a montré une inflammation hépatique dans 58% des cas et une fibrose avancée dans 38%. Environ 10% des patients présentent une cirrhose asymptomatique, nécessitant un suivi spécifique.

Un projet de suivi à long terme des patients de l'étude **QUID-NASH** est proposé par **Jean-François GAUTIER**. L'objectif principal est de mesurer la progression de la fibrose sur 5 ans et d'en analyser les déterminants. Des examens complets (imagerie, biopsie, analyses sanguines) seront répétés pour affiner la compréhension. L'intégration de marqueurs immunitaires et d'imagerie pourrait aboutir à un **score MASLD**, qui permettrait de prédire la gravité et la progression de la **MASLD** chez les diabétiques de type 2, remplaçant de la biopsie du foie.

ALLOCATION DE RECHERCHE CLINIQUE

300 000€

